




ORTICOLE

(melanzana, peperone,
fagiolo, pomodoro)



Culture in serra

FASE	PRODOTTO	DOSI	NOTE
PREPARAZIONE DEL TERRENO			
	NP micro	3 - 5 kg/1000 m ²	Trattamento radicale.
POST-TRAPIANTO - PER FAVORIRE LO SVILUPPO DELL'APPARATO RADICALE			
	RADICAL L	1 - 3 kg/1000 m ²	Trattamento radicale.
SVILUPPO PIANTA			
	FOS. 54	2,5 - 5 kg/1000 m ²	Trattamento radicale. Almeno 2 applicazioni durante tutto il ciclo.
	Fe. 118 	0,5 kg/1000 m ²	Trattamento radicale.
INIZIO FIORITURA E CRESCITA DEI FIORI			
	FLOWER-TOP HORT	100 - 200 g/1000 m ² 100 - 250 g/1000 m ²	Trattamento radicale. Trattare ogni 12-15 giorni.
ALLA COMPARSA DEI PRIMI FRUTTI PER INGROSSAMENTO E MATURAZIONE			
	K-L HORT	250 - 300 g/1000 m ² 100 - 200 g/1000 m ²	Trattamento radicale.
Alternare ogni 12-15 giorni per lo sviluppo dei palchi fiorali superiori con:			
	FLOWER-TOP HORT	100 - 200 g/1000 m ² 100 - 250 g/1000 m ²	Trattamento radicale.

NOTE:

- E' consigliato, per una migliore colorazione dei frutti, l'applicazione periodica di M.140 nelle dosi 100-200 g/1000mq.
- In presenza di acque dure, è molto importante introdurre ELASIL con dosaggio dello 0,1 % alcuni minuti prima di aggiungere gli altri prodotti di concimazione, per controllare l'idrolisi alcalina.