



ORTICOLE DA FOGLIA VERDE



Colture in serra

FASE	PRODOTTO	DOSI	NOTE
PREPARAZIONE DEL TERRENO			
	NP micro	4 kg/1000 m ²	Tattamento localizzato.
POST-TRAPIANTO - PER FAVORIRE LO SVILUPPO DELL'APPARATO RADICALE			
	RADICAL L	1 kg/1000 m ²	Tattamento radicale.
SVILUPPO VEGETATIVO			
	MICROKEL L	300 g/1000 m ²	Tattamento radicale. Da ripetere dopo 10-12 giorni.
	AMMIN. 11 L K-L	200 g/1000 m ² 200 g/1000 m ²	Tattamento fogliare. Applicare ogni 10-12 giorni per tutto il ciclo.

N.B.: In presenza di acque dure, per controllare l'idrolisi alcalina, è molto importante introdurre ELASIL al dosaggio dello 0,1 % alcuni minuti prima di aggiungere gli altri prodotti di concimazione.

Colture a pieno campo

PRODOTTO	DOSI	NOTE
CONCIMAZIONE DI FONDO		
NP micro	30 kg/ha	Tattamento localizzato.
TRAPIANTO		
RADICAL L	10 kg/ha	Fertirrigazione.
SVILUPPO E CRESCITA		
FERTAMMIN L RADICALE EN 8-10-45 P	10 kg/ha 50 kg/ha	Fertirrigazione. Applicare ad intervalli di 15 giorni.

In caso di micro-carenze, eseguire un trattamento con M.140 alla dose di 4 kg/ha.