



POMODORO DA INDUSTRIA

AGRICOLTURA BIOLOGICA



Trattamento localizzato e radicale

FASE	PRODOTTO	DOSI	NOTE
------	----------	------	------

POST-TRAPIANTO, PER FAVORIRE LO SVILUPPO DELL'APPARATO RADICALE

FERTAMMIN L RADICALE	1,5 kg/1000m ²	Trattamento radicale.
ALGA P	300 g/1000m ²	
RAME L	300 g/1000m ²	

SVILUPPO PIANTA

Fe. 48	0,5 kg/1000m ²	Trattamento radicale.
--------	---------------------------	-----------------------

INIZIO FIORITURA E CRESCITA DEI FIORI (ogni 12-15 giorni)

FERTAMMIN L RADICALE	3 kg/1000m ²	Trattamento radicale.
BORO.11	1,5 kg/1000m ²	Trattamento fogliare.

ALLA COMPARSA DEI PRIMI FRUTTI PER INGROSSAMENTO

ALGA P	200 g/1000m ²	Trattamento radicale. Alternare ogni 12-15 giorni .
--------	--------------------------	---

20-25 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA

NATURAL BRIX	8-10 kg/ha	Trattamento fogliare.
--------------	------------	-----------------------

Per una migliore colorazione dei frutti, è consigliata l'applicazione periodica (ogni 15 giorni) di M. 140 nella dose di 100 g/1000m².