



POMODORO DA INDUSTRIA



Trattamento fogliare (dopo il trapianto)

Le colture che non possono usufruire dell'irrigazione goccia a goccia e che pertanto devono essere innaffiate a scorrimento od altro, hanno bisogno per aumentare il rendimento e la qualità, di avere degli apporti nutrizionali per via fogliare. Bisogna procedere ad applicare al suolo il concime stabilito abitualmente per preparare il terreno prima del trapianto. A terreno pronto fare il trapianto.

E' da questo momento che, dopo qualche giorno o una settimana, si devono iniziare i trattamenti fogliari di supporto.

FASE	PRODOTTO	DOSI	NOTE
1° TRATTAMENTO: A PARTIRE DALLA FIORITURA			
	FLOWER-TOP P-L FLOR	600 g/ha 3 kg/ha	Trattamento fogliare.
2° TRATTAMENTO: DOPO 15 GIORNI DAL PRECEDENTE			
	GORDON K-L	800 g/ha 3 kg/ha	Trattamento fogliare.
3° TRATTAMENTO: DOPO 15 GIORNI DAL PRECEDENTE			
	FLOWER-TOP P-L FLOR	600 g/ha 3 kg/ha	Trattamento fogliare.
4° TRATTAMENTO: DOPO 15 GIORNI DAL PRECEDENTE			
	GORDON K-L	800 g/ha 3 kg/ha	Trattamento fogliare.
20-25 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA			
	TOMACOLOR	6 - 8 kg/ha	Trattamento fogliare.

Trattamenti con l'utilizzo di un volume d'acqua di 1000 lt per ettaro.

NOTA IMPORTANTE:

L'azione combinata di FLOWER-TOP, K-L e GORDON, determina un aumento della produzione per ettaro, un maggiore peso dei pomodori, un maggiore numero di pomodori rossi alla raccolta, una minore acidità e una maggiore consistenza che ha permesso migliore manipolazione e trasporto fino ai mercati di destinazione.