



FASE	PRODOTTO	DOSI	NOTE
------	----------	------	------

DOPO IL TRAPIANTO

	RHIZO SOIL	3 - 4 kg/ha	Tre applicazioni al terreno (insieme all'acqua di irrigazione). Trattare ogni 15 giorni.
	ALGA P e/o AMMIN. 11 L	2 kg/ha	Applicazione fogliare per evitare lo stress post-trapianto.
	ALGA P	1 kg/ha	Effettuare il trattamento solo se le temperature scendono sotto i 16°C.

DUE SETTIMANE DOPO IL TRAPIANTO

	K-L	3 kg/ha	Applicazione fogliare. I trattamenti possono essere effettuati alla fine dell'irrigazione nel caso più abituale dell'irrigazione per aspersione.
--	-----	---------	--

DUE SETTIMANE DOPO

	P-L FLOR	2 kg/ha	Applicazione fogliare. I trattamenti possono essere effettuati alla fine dell'irrigazione nel caso più abituale dell'irrigazione per aspersione.
--	----------	---------	--

Continuare i trattamenti di K-L e P-L FLOR con la stessa cadenza fino ad **APERTURA FIORI**.

DOPO L'APERTURA DEI FIORI

Sostituire K-L con P-L FLOR per accelerare e omogeneizzare la maturazione delle foglie (mantenendo la stessa scadenza di trattamento)