




## Trattamento fogliare

FASE	PRODOTTO	DOSI	NOTE
<b>FORMAZIONE GRAPPOLO</b>			
	TOP FRUIT	2 kg/ha	-
<b>INIZIO FIORITURA</b>			
	TOP FRUIT	2 kg/ha	-
	BORO. 11 	1 kg/ha	-
<b>SFIORITURA</b>			
	TOP FRUIT	2 kg/ha	-
<b>ALLEGAGIONE</b>			
	EN 8,5-20-30 P	4 kg/ha	Ripetere il trattamento 3-4 volte ogni 15 giorni.
<b>INVAIATURA</b>			
	K-L	2,5 kg/ha	Per intensificare il colore e il grado zuccherino. Primo trattamento: 3 kg/ha. Dopo 15 giorni: 2 kg/ha.
<b>N.B.: In caso di ingiallimento fogliare dovuto a ferro-carenza, eseguire il seguente trattamento: M.140 1 kg/ha + Fe.130 1kg/ha.</b>			
<b>TOTALE PRODOTTI UTILIZZATI:</b>			
	TOP FRUIT	6 kg/ha	EN 8,5-20-30 P
	BORO. 11	1 kg/ha	K-L
			12-16 kg/ha
			5 kg/ha